Séance du 24 juillet 1880.

PRÉSIDENCE DE M. HARDY.

M. Sauvage fait les communications suivantes :

Note sur quelques poissons recueillis par M. Letourneux, en Épire, à Corfou et dans le lac Maréotis,
par M. H.-E. Sauvage.

Le Muséum d'histoire naturelle a reçu tout dernièrement une collection de poissons recueillis par M. Letourneux en Épire, à Corfou et dans le lac Maréotis ; bien que composée d'un petit nombre d'espèces, cette collection n'en présente pas moins assez d'intérêt pour que nous appelions sur elle l'attention de la Société.

LAC MARÉOTIS.

Le lac Maréotis ou Mariout est un grand lac de la Basse-Égypte, qui s'étend l'espace d'environ 60 kilomètres le long de la Méditerranée, depuis Alexandrie jusqu'à la Tour-des-Arabes; il communique avec le lac Madiéh par une petite embouchure et avec le Nil par le canal d'Asarah. Les espèces recueillies dans ce lac par M. Letourneux sont :

1° *Echeneis naucrates*, Lin. — Un exemplaire avec 22 lamelles au disque.

2° *Chromis niloticus*, Hass. — Deux exemplaires de $0^{m}110$ de long ont une tache noire à l'opercule; le corps, de couleur vert-olive, porte quelques taches noires mal définies ; l'anale et la caudale sont noirâtres; la dorsale molle est ornée de lignes obliques de couleur brune.

Nous regardons comme des jeunes de cette espèce des individus longs de $0^{m}050$, bien que la coloration soit dif-

férente. L'opercule ne porte pas de tache; le corps est parcouru par une dizaine de lignes verticales noires peu marquées; les dorsales, surtout la dorsale molle, est ornée de lignes onduleuses de couleur brune; ces lignes sont presque effacées à la caudale. Sur deux exemplaires longs de 0m075 la tache noire de l'opercule apparaît, bien que les lignes verticales, au nombre de dix, persistent encore, quoique commençant à s'effacer; l'anale porte trois lignes onduleuses noirâtres, la dorsale molle cinq lignes de même couleur; la caudale est ornée de trois à quatre lignes semblables (1).

Hemichromis Letourneuxi, Sauvg.

D. XIV, 10; A. III, 7; L. lat. 24; L. trans. 3/9.

Hauteur du corps égale à la longueur de la tête, contenue deux fois et deux tiers dans la longueur, caudale non comprise. Tête plus longue que haute; ligne rostrale concave au devant des yeux; museau obtus, aussi long que l'œil, dont le diamètre est compris trois fois et deux tiers dans la longueur de la tête; les deux dents médianes de la mâchoire à peine plus longues que les autres; cinq rangées d'écailles à la joue; espace interorbitaire un peu plus large que le diamètre de l'œil. Dorsale commençant au-dessus des pectorales; longueur de la dernière épine dorsale comprise deux fois et demie dans la longueur de la tête. Rougeâtre, avec sept ou dix lignes de petites taches bleues sur les flancs; des taches de même couleur sur l'opercule et sur les joues; une tache noire au sommet de l'opercule, une près de la terminaison de la portion supérieure de la ligne latérale, une autre tache, plus petite, à l'origine de la caudale; deux lignes de petites taches bleues aux dorsales; les autres nageoires transparentes. Longueur 0m070.

Le genre Hemichromis est cantonné dans la partie

(1) Tous les poissons dont il est question dans cette note ont été pêchés au mois de juin.

ouest de l'Afrique, Sénégal et Gabon, bien que l'*H. guttatus*, Gthr. ait été signalée au Cap ; il est intéressant d'en trouver une espèce dans la Basse-Égypte.

3° *Synodontis schal*, Bl. — Cette espèce a une distribution géographique fort étendue; elle a été signalée dans le Nil, au Sénégal, dans le Zambèze.

4° *Barbus bynni*, Forsk. — L'espèce n'a encore été trouvée que dans le Nil.

5° *Cyprinodon calaritanus*, Bon. — M. Letourneux n'a recueilli de cette espèce que de jeunes individus; les flancs ont une bande argentée et dix à douze lignes verticales noirâtres, les lignes de la partie postérieure des flancs étant les plus marquées.

CORFOU.

La faune ichthyologique de Corfou, la plus importante des îles Ioniennes, ne semblant pas avoir encore attiré l'attention des naturalistes, il y a avantage à donner la liste suivante des espèces récoltées par M. Letourneux :

Saline de Lefkimo.

Cyprinodon calaritanus, Bon.

Long. 0^{m}380; ♀, d'un vert-olive ; une ligne argentée le long des flancs ; neuf taches de couleur noire le long des flancs.

Long. 0^{m}040 ; ♀, cinq taches formant bandes dans la moitié postérieure du corps ; une large bande argentée le long des flancs.

Long. 0^{m}035; ♀, une tache noire au pédicule caudal ; des bandes dans la partie postérieure du corps.

Long. 0^{m}030 ; ♂, une ligne argentée le long des flancs ; une petite tache noire au pédicule caudal ; dix à onze taches noires sur les flancs.

Long. 0^{m}040; ♂, verdâtre avec sept bandes de couleur argentée, plus étroites que les espaces qui les séparent, occupant presque toute la hauteur dans les deux tiers postérieurs du corps; nageoires transparentes.

Cressida.

Trois sources assez considérables pour faire tourner un moulin se jettent dans la lagune nommée Lemni; elles ont fourni les espèces suivantes :

Mugil cephalus, Cuv. — Espèce connue de toute la Méditerranée, du Nil, de Madère, des lacs d'eau douce de Tunis, de la côte ouest d'Afrique (Sénégal, Niger).

Fundulus Letourneuxi, n. sp.

Mâles : D. 9; A. 11; L. lat. 29 à 32; L. trans. 8.

Hauteur du corps contenue quatre fois et deux tiers, longueur de la tête quatre fois dans la longueur totale. Diamètre de l'œil un peu plus grand que la longueur du museau, compris trois fois et demie dans la longueur de la tête. Dorsale et anale un peu plus allongées que chez les femelles de même taille. Corps vert-olive, rembruni vers le dos chez certains individus, avec quatorze à dix-huit bandes transversales noirâtres, plus étroites que les espaces qui les séparent; une ligne noire allant de la dorsale à l'occiput; extrémité de l'anale noirâtre; trois lignes formées de petits points noirs à la base de la dorsale, dont l'extrémité est noire; de petites taches noires sur la caudale; extrémité des ventrales et des pectorales noires. Longueur $0^{m}045$.

La même coloration se retrouve déjà sur des individus de $0^{m}022$ de long, les bandes étant toutefois peu marquées et les lignes noires des nageoires peu visibles.

Femelles : D. 9; A. 11; L. lat. 29 à 32; L. trans. 8.

Hauteur du corps contenue quatre fois et deux tiers dans la longueur totale, longueur de la tête trois fois et deux tiers dans la même dimension. Dessus du crâne aplati; espace interoculaire bien plus large que le diamètre de l'œil, qui égale la longueur du museau et se trouve compris trois fois et demie dans la longueur de la tête. Vert-olive; une bande étroite d'un bleu foncé le long de la ligne latérale; chez certains individus une ligne

de même couleur allant de la base de la dorsale à la nuque ; opercule cœrulescent, piqueté de noirâtre; nageoires grisâtres. Longueur 0m070.

Individus jeunes de 0m045 de long. Coloration comme chez l'adulte. Hauteur du corps contenue quatre fois et demie, longueur de la tête trois fois et deux tiers dans la longueur totale. Diamètre de l'œil un peu plus grand que la longueur du museau, compris trois fois et demie dans la longueur de la tête.

Individus très-jeunes de 0m020 de long. Coloration d'un vert olive uniforme. Hauteur du corps comprise cinq fois, longueur de la tête quatre fois dans la longueur totale.

ÉPIRE.

M. Letourneux n'a recueilli qu'une seule espèce en Épire (Albanie méridionale), dans la rivière Nicopolis, près de Prévéjà.

Leuciscus (Leucos) aulus, Bon. sp.— Cette espèce, d'après M. Günther, représente le *Leuciscus rutilus* dans le sud de l'Europe ; cet auteur la cite dans le lac de Garde, la rivière Rieka (Montenegro) et la rivière Marenta (Dalmatie). Heckel et Kner la citent à Maseniz, en Dalmatie, et à Trévise (Vénétie). Le *Leucos rubella*, variété du *Leucos aulus*, a été recueilli à Brisclegg, dans le Tyrol, dans le lac de Garde, en Istrie et en Dalmatie ; le *Leucos basak,* autre variété de la même espèce, est du lac de Drusino, en Dalmatie. Cuvier et Valenciennes mentionnent l'espèce dans le Piémont et dans le lac Majeur ; elle est d'ailleurs représentée dans ses deux localités par une variété qui a été désignée sous le nom de *Leuciscus altus*.

Description de quelques Blennioïdes de la collection du Muséum d'histoire naturelle,

par M. H.-E. Sauvage.

1. *Blennius nigrescens.* n. sp.

D. XII, 18 ; A. 22.

Hauteur du corps contenue quatre fois deux tiers, lon-